

Información de Producto

INMUNO-D3®

Dosis:

Adultos: Una (1) cápsula blanda al día.
No superar la dosis diaria recomendada.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes del producto.

Hipercalcemia e hipercalciuria.

Precauciones y advertencias:

La hipersensibilidad a la vitamina D puede ser un factor etiológico en niños con hipercalcemia idiopática, en estos casos la vitamina D debe ser estrictamente restringida.

No utilizar como sustituto de una dieta equilibrada.

FISH OIL 1000 mg (Omega 3)

Dosis:

Adultos: Tomar de 1 a 3 cápsulas blandas al día, de preferencia con las comidas.
No superar la dosis diaria recomendada.

Advertencias y precauciones:

En embarazo y lactancia consulte a su médico. No tome si está usando anticoagulantes. En caso de sobredosis accidental, descontinuar el uso y consultar para asistencia médica inmediata.

No debe utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada recomendada.

No hay estudios que aseguren su uso en personas con enfermedad renal o hepática grave. Puede aumentar el riesgo de sangrado si toma junto con aspirina, puede producir una disminución de la presión sanguínea.

No exceda la dosis indicada. No es seguro su uso en personas menores de 18 años, mujeres gestantes o en período de lactancia. No apto para vegetarianos.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes del producto. No usar en pacientes con trastornos de coagulación, dislipidemia y alérgicos al pescado.

Reacciones adversas:

Dolor abdominal, mal aliento, regusto a pescado, acidez de estómago, aumento de los niveles de colesterol de las lipoproteínas de baja densidad (LDL), heces blandas, náuseas y sarpullido.

Interacciones:

Con fármacos antihipertensivos, medicamentos anticoagulantes y antiplaquetarios.

OQCOP S.A.C.

Av. Industrial N° 160, Of. A, 2do. Piso,
Urb. La Aurora – Ate – Lima. Perú
R.U.C.: 20605653333

Tel.: 326 7200
www.corpol.com.pe



Asesor:

Teléfono:

Huesos y articulaciones

INMUNO-D3®

- Contribuye a la absorción calcio y fósforo.
- Ayuda a formar y mantener los huesos y dientes sanos.
- Interviene en la regulación del sistema inmunológico.

Dosis: Adultos: tomar 1 cápsula al día.
No superar la dosis diaria recomendada.

Presentación: Frasco x 60 Cápsulas Blandas.

Fuente:
Escanear código QR.

Cardio

Ácidos Grasos Omega-3

- Disminuye los niveles de triglicéridos y colesterol.
- Ayuda a mantener la salud cardiovascular.
- Apoya la función cerebral y ocular.


Dosis: Adultos: tomar 1 cápsula blanda 3 veces al día, de preferencia con las comidas.

Presentación: Caja x 30 Cápsulas Blandas.

Fuente:
Escanear código QR.

Para mayor información ver insertos de cada producto en sus respectivas cajas.


NO ES MATERIAL PUBLICITARIO, EXCLUSIVO PARA PROFESIONALES DE LA SALUD QUE PRESCRIBEN Y DISPENSAN.



Vademécum

FinaVida
UNA MEJOR VIDA, HOY

Información de Producto



Salud femenina

ÁCIDO FÓLICO

- Prevención y tratamiento de la deficiencia por ácido fólico.
- Prevención de defectos en el tubo neural en el feto.
- Anemia por déficit de ácido fólico.

Dosis: Adultos: tomar una tableta recubierta al día.

Presentación: Frasco x 60 Tabletas Recubiertas.

Fuente:
Escanear código QR.



Salud femenina

VITAMINA E

- Actúa como antioxidante.
- Protege las células contra radicales libres .

Dosis: Adultos: Tomar una cápsula al día.
No superar la dosis diaria expresamente recomendada.

Presentación: Frasco x 60 Cápsulas Blandas.

Fuente:
Escanear código QR.



Salud femenina

BIOTIN COMPLEX

- Ayuda a mantener el cabello, uñas, mucosa y piel saludable.
- Ayuda al cuerpo a metabolizar los nutrientes.
- Apoya en la producción de energía.

Dosis: Adultos: Tomar una (1) tableta recubierta diaria, preferiblemente con las comidas.

Presentación: Frasco x 60 Tabletas Recubiertas.

Fuente :
Escanear código QR.



Sistema inmune y cerebro

B-12

- Anemia perniciosa.
- Metabolismo de las proteínas.
- Ayuda en la formación de los glóbulos rojos.
- Mantenimiento del sistema nervioso.

Dosis: Adultos: 1000mcg (1 tableta) al día, preferiblemente con una comida o según las indicaciones de su médico. No superar la dosis diaria recomendada.

Presentación: Frasco x 60 Tabletas.

Fuente :
Escanear código QR.



Para mayor información ver insertos de cada producto en sus respectivas cajas.

NO ES MATERIAL PUBLICITARIO, EXCLUSIVO PARA PROFESIONALES DE LA SALUD QUE PRESCRIBEN Y DISPENSAN.

ÁCIDO FÓLICO 800 mcg

Indicaciones: Suplemento dietético.

Dosis: Adulto: Tomar 1 tableta recubierta al día.

Los productos dietéticos no deben utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada.

Advertencias y precauciones:

Consulte a su médico en caso de embarazo, periodo de lactancia, anemia, convulsiones, enfermedades del corazón y cáncer. La ingesta diaria de ácido fólico no debe exceder de 1000 mcg. No superar la dosis diaria expresamente recomendada.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad a alguno de sus componentes

Reacciones adversas:

Dosis altas pueden producir calambres abdominales, diarrea, erupciones, trastornos del sueño, irritabilidad, confusión, náusea, molestias estomacales, cambios en el comportamiento, reacciones en la piel, convulsiones, gas y excitabilidad.

Interacciones:

5-Fluorouracil, capécitabina, fenitoína, fenobarbital, fosfenoftalina, metotrexato, pirimetamina, primidona y té verde.

VITAMINA E

Indicaciones:

Vitamina E 400 UI Cápsula Blanda está indicado como "Suplemento Dietético".

Contraindicaciones:

No tome Vitamina E 400 UI Cápsula Blanda: Si es alérgico a la vitamina E o a cualquiera de los demás componentes de este producto (incluidos en la sección 9). Si padece algún trastorno de la coagulación de la sangre, vea el siguiente apartado y "Interacciones con otros medicamentos y otras formas de interacción".

Precauciones de empleo adecuadas:

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar Vitamina E 400 UI Cápsula Blanda.

No debe tomar dosis superiores a las recomendadas. Si tiene riesgo de padecer tromboflebitis (hinchazón de una vena causada por un coágulo de sangre), la vitamina E en dosis elevadas aumenta su riesgo, incluidas las mujeres que toman anticonceptivos con estrógenos (hormonas sexuales femeninas).

Interacciones con otros medicamentos y otras formas de interacción: Toma de Vitamina E 400 UI Cápsula Blanda con otros medicamentos: Comunique a su médico o farmacéutico si está utilizando, ha utilizado recientemente o podría tener que utilizar cualquier otro medicamento. Los siguientes medicamentos pueden interactuar con Vitamina E 400 UI Cápsula Blanda cuando se emplean al mismo tiempo: Anticoagulantes orales (medicamentos para hacer la sangre más fluida), como acenocumarol, warfarina, dicumarol, ya que la vitamina E aumenta su efecto. Tocoferolana (una forma de vitamina E), que puede aumentar el efecto de este producto. Estrógenos, incluidos los anticonceptivos orales.

Medicamentos que afectan a la absorción gastrointestinal de la vitamina E: Colestiramina y colestipol (para reducir los niveles de colesterol) Orlistat (para reducir la absorción de grasas) Aceite mineral o parafina líquida (ayudan a la evacuación del intestino) Si se toman conjuntamente se deben espaciar las dosis al menos 2 horas.

Dosis y vía de administración:

Adultos: Una cápsula Blanda de Vitamina E 400 UI al día, por vía oral.

Período de validez:

30 meses. No utilice Vitamina E 400 UI Cápsula Blanda después de la fecha de expiración que aparece en los envases.

Precauciones especiales de conservación:

Almacenar a temperatura no mayor de 30 °C. Venta sin receta médica. Manténgase fuera del alcance de los niños. "No utilice el producto si observa signos visibles de deterioro del producto" "La eliminación del producto no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él, se realizará de acuerdo a lo que indique su médico o farmacéutico"

BIOTIN COMPLEX

Indicaciones:

Para adulto, tomar una (1) tableta recubierta diaria, preferentemente con las comidas. Que usted toma y siga su consejo.

Advertencias:

Si está en período de embarazo, lactancia, tomando medicamentos, o si piensa realizar algún procedimiento médico consulte a su médico antes de usar. Suspenda su uso y consulte a su médico si ocurre alguna reacción adversa.

Precauciones:

No exceder la dosis recomendada. Usar con precaución en pacientes con úlcera péptica. Administrar alejado del consumo de productos lácteos.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad conocida a cualquiera de los componentes de la fórmula.

Reacciones adversas:

Efectos gastrointestinales ocasionales como dolor de estómago y náuseas Interacciones: Levodopa, tetraciclina, warfarina, levotiroxina.

Dosis: 1 Tableta recubierta al día.

B-12 1000 mcg

Indicaciones: Suplemento dietético.

Dosis:

Adultos: 1000 mcg (1 tableta) al día, preferiblemente con una comida o según las indicaciones de su médico. No superar la dosis diaria recomendada.

Advertencias y precauciones:

Consulte a su médico antes de tomar este producto si tiene una enfermedad vascular (como una enfermedad cardíaca o antecedentes de accidente cerebrovascular) o diabetes, se enfrenta a una cirugía, tiene problemas de sangrado o se somete a cualquier tratamiento que pueda afectar la capacidad de la sangre para coagular.

Si está tomando algún medicamento, está embarazada o en período de lactancia, consulte a un médico antes de tomarlo.

Suspender su uso y consultar a un médico si se produce una reacción adversa.

No debe utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada.

Para leer las fuentes de información de cada producto escanear el siguiente código QR.